

Operative Behandlung
des
Magenkrebses.

Inaugural - Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Generalstabsarztes Professors

Dr. J. N. Ritter von Nussbaum

der medicinischen Fakultät


der k. Ludwig-Maximilians-Universität

vorgelegt

von

Andreas Manarakis,


Cand. med. aus Athen.



München 1879.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Operative Behandlung des Magenkrebses.



Inaugural - Dissertation

zur Erlangung der Doctorwürde

unter dem Präsidium

des Herrn Generalstabsarztes Professors

Dr. J. N. Ritter von Nussbaum

der medicinischen Fakultät


der k. Ludwig-Maximilians-Universität

vorgelegt

von

Andreas Manarakis,

Cand. med. aus Athen.



München 1879.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn in München.

Schon seit langer Zeit hat man alles Mögliche empfohlen, um die Menschen von diesem Uebel zu befreien.

Leider hat sich die interne Medicin dem Magen- wie anderen Carcinomen gegenüber machtlos erwiesen. Man kam damit auf dasjenige Mittel zurück, durch welches die externen Carcinome geheilt werden, nämlich auf die Exstirpation.

Früher, als man noch grofse Furcht hatte vor der Verletzung des Peritonäums, wagte es kein Chirurg — und mit Recht — die Bauchhöhle zu eröffnen; jetzt aber, da man die Mittel kennen lernte, durch welche die Entzündung des Peritonäums vermieden werden kann, legt man mit mehr Muth die Hand an das Messer, um die Unterleibshöhle zu eröffnen und dadurch die Menschheit von diesem schrecklichen Leiden zu befreien. Vor allem gestützt auf [die Experimente von Winiwarter und Guffenbaur an Thieren und jene Wegners an der Peritonahöhle von Thieren — kann man sagen, dafs eine solche partielle Exstirpation auch bei den Menschen möglich ist.

Bevor ich aber die Indication der Operation des Magenkrebses beleuchten und vertheidigen will, werde ich kurz einige hierauf bezügliche Fragen besprechen:

Wir wollen betrachten: was versteht man unter dem Namen Krebs? ferner ist derselbe heilbar und unter welchen Bedingungen? Endlich wollen wir betrachten: welche Erfahrungen der Neuzeit haben uns über die frühere Gefährlichkeit der Laparotomien Aufklärung gebracht? und schliefs-

lich: unter welchen Cautelen kann jetzt eine solche Operation gerechtfertigt erscheinen?

I.

Was ist der Krebs; ist er eine lokale Krankheit, oder eine Dyscrasie? und unter welchen Bedingungen kann er radikal entfernt werden?

Wie jedes organische Wesen, so hat auch der Mensch ein Stadium des Wachsthumes, der Blüthe und des Verwelkens. In dem letzteren Stadium folgen nicht alle Gewebe dem Verfall mit derselben Raschheit.

Das am meisten Widerstand leistende scheint das Epitel zu sein. Der Krebs ist nur eine Wucherung des Epitels auf Kosten der übrigen Gewebe.

Dafs aber der Krebs eine lokale Krankheit ist und keine Dyscrasie, wird durch den Erfahrungssatz klar, dafs er nur unter gewissen localen Vorbedingungen und nicht nur im vorgerückten Alter entsteht bei sonst ganz gefunden Leuten, wie man aus einigen Beispielen ersieht, welche ich Thierfch's Werk über den Epithelialkrebs entnommen habe.

„Dresch Johann, Bauer, 55 Jahre alt. Es entstand bei ihm auf der Mitte der Unterlippe ein kleines, etwa linsengroßes Wärzchen, welches beinahe zwei Jahre bestand, ohne zu wachsen.

Zufällig rifs (1834) Patient das Wärzchen weg; die Rifsfläche wurde trotz vielfacher Heilversuche durch Aetzung zu einem fressenden Geschwüre. 1836 wurde daselbe exstipirt; drei Monate darnach Recidive, im August 1837 starb er.“

„Mankus Friedrich, Schlosser, 61 Jahre alt. Im Jahre 1847 bildete sich eine Warze an der Unterlippe; im Sommer 1848 Exstirpation und Heilung nach 9 Monaten. Recidive und Tod im August 1849.“

Ein Zeichen des rein localen Characters dieser Krankheit ist, daß, wenn man frühzeitig und ausgedehnt operirt, der Kranke radical geheilt sein kann. Diefs wurde dargethan durch einige Operationen, welche Thiersch und Nufsbaum anführen und von denen ich einige hier aufzähle.

„Popp Katharina, 57 Jahre alt, bekam im Dezember 1857 plötzlich eine Geschwulst, welche die ganze rechte Wange einnahm, sich röthete und dann sowohl gegen den Mund hinein als auch gegen Aufsen aufbrach. Nach 2 Monaten wurde der ganze Oberkiefer reseziert, sowie der Jochbogen; hierauf die Schläfengrube gereinigt, weil sich die Neubildung bis dahin erstreckte; auch der obere Theil der Mandibula wurde reseziert; 6 Jahre nach der Operation noch keine Recidive.

„Bräuning Dor., 31 Jahre alt, hatte 12 Jahre lang eine Warze, aus welcher im April 1854 eine Geschwulst des Oberkiefers entstand; 7 Monate darnach Excision; 10 Jahre später noch keine Recidive.“

„Hermann Josefa, Gärtnerin, wurde im Jahre 1856 von Professor von Nufsbaum am Gebärmutterkrebs operirt. Die Patientin lag schwer krank im Bette und die humorale Infection war weit gediehen. Nachdem Professor von Nufsbaum ein paar Hände voll zerfallenen Krebsgewebes herausgeräumt hatte, legte er den Ecraseur an, welcher sehr weit hinaufgerutscht war und die Plica Douglasii eröffnet, wodurch ein Vorfall der Gedärme entstand. Man hielt nun die Gedärme mit einem Schwamme zurück, und fürchtete den schlimmsten Verlauf; allein die Patientin erholte sich rasch und vollkommen, der Pholapsus heilte, und 19 Jahre nachher erschien noch keine Recidive.“

Noch ein Beispiel führt Professor von Nufsbaum an, aus dem man ersieht, daß der Krebs durch eine weit ausgedehnte Operation radical heilbar ist.

„Im Juli 1857 kam ein 59 jähriger Mann zu ihm, welcher am Krebse des Penis litt. Er überliefs Profeffor von Nufsbaum die Ausdehnung der Operation und Prof. von Nufsbaum nahm ihm nicht allein alles Kranke fondern auch noch einen kleinen Theil des gefund aussehenden Penis weg, um auch die fogenannte regionäre Recidive auszufchließen. Der Mann war noch nach 18 Jahren vollkommen frifch und gefund.“

Leroi d'Etoilles fammelte 44 Fälle, welche an Krebs operirt waren und nach 10—20—32 Jahren noch keine Recidive zeigten.

Aus diesen wenigen Angaben erfieht man, dafs der Krebs eine rein locale Krankheit ift, und durch eine rechtzeitige und ausgedehnte Operation geheilt werden kann.

Um aber am Magen zu operiren, mufs man zuvor das Peritonäum durchfchneiden. —

Bis jetzt wufste man nicht, warum geringe Eingriffe am Peritonäum fo leicht den Tod bringen und welches die Urfache davon ift, und folglich kannte man nicht die Mittel diefe Feinde des Peritonäums unfehädlich zu machen; erft in neuerer Zeit und vor Allem durch die Experimente von Wegner, wodurch bewiefen worden ift, dafs zwei Feinde beftehen; erftens die Abkühlung und zweitens die faulige Zerfetzung des Exsudats, — rückte man der Wahrheit näher.

Wegner machte folgende Experimente:

„Er eröffnete einem Kaninchen, nachdem er es auf einem Operationsbrette befeftiget hatte, in einer Zimmertemperatur von 15—18° C. das Abdomen vom Proceffus ensiformis bis zum Scheitel der Blafe. Die Därme quollen je nach den ruckweifen Bewegungen des Thieres mehr oder weniger plöztlich hervor. Jede Berührung und Zerrung wurde forgfältig vermieden, die Austrocknung der der Luft ausgefetzten Theile durch Aufträufeln von $\frac{1}{2}\%$ Chloratronlöfung verhindert.

Zunächst beobachtete er eine kurze Zeit ziemlich intensive peristaltische Bewegungen, leichte Röthung der Serosa; nach höchstens 10 Minuten wurde die peristaltische Bewegung der Gedärme langsam, stund zeitweise still und verschwand allmählig ganz. Die Hyperämie des Darmes ging gleichzeitig in eine venöse über, die rosige Färbung der Serosa verwandelte sich in eine mehr bläuliche. In dieser Zeit begann stofs- und ruckweise ein intensives Muskelzittern, die Gefäße am Ohre und anderen sichtbaren Schleimhäuten waren verengt, die Mundschleimhaut blaß. Offenbar empfand das Thier ein lebhaftes Kältegefühl, die Respiration verlangsamte sich, wurde oberflächlicher, ebenso die Herzaction schwächer und langsamer. Alle diese Erscheinungen nahmen im Verlaufe von 2 Stunden stetig zu; zu dieser Zeit war der Darm ganz unbeweglich und auf die stärkste mechanische Reizung keine Contraction mehr zu erzielen, Respiration und Herzschlag sehr verlangsamt und schwach, das Sensorium in dem Grade herabgesetzt, daß nur auf sehr intensive Reizungen eine schwache Reaction mehr erfolgte. Die Pupillen waren dilatirt, die spontanen Bewegungen hatten vollständig aufgehört.

Weiterhin fand nur noch eine außerordentlich langsame Steigerung aller dieser Erscheinungen statt, und erst nach 7—10 Stunden, nachdem jede Reaction auf die stärksten Reizungen aufgehört hatte, erfolgte unter mühsamer, ächzender Respiration der Tod. Eine Exsudation auf der Peritonealoberfläche war während der ganzen Zeit nicht erfolgt.“

Daß aber bloß die Temperatur-Erniedrigung dieß bewirkte und nicht die Luft, bewies das zweite Experiment, welches Wegner machte und welches ich ebenfalls hier anführe:

„Einem Kaninchen wird in derselben Weise, wie vorher beschrieben, das Abdomen geöffnet bei einer Zimmertemperatur von 15—18° C. Die Därme lagert man etwas

seitlich auf einer passenden Unterlage. Um den Operationstisch herum befinden sich fünf mit Wasser gefüllte bis zur Siedehitze fortwährend geheizte Kolben, die mit ihren Ausflusssähren radiär gegen das Centrum des Operationstisches und gegen das dort befindliche Abdomen des Thieres gestellt, fortwährend nach dieser Richtung heisse Wasserdämpfe ausstrahlen. Die Stellung der Kolben ist so eingerichtet, dass das Zusammenfließen der von ihnen ausgehenden Dämpfe stattfindet etwa 2—3 Centim. über dem Abdomen des Thieres.

Die Entfernung derselben vom Operationstische ist so disponirt, dass die sehr heiss aus dem Ausflusssähre des Kolbens ausströmenden Dämpfe sich auf ihrem Wege so weit abgekühlt haben, dass die unmittelbar unter den Eingeweiden befindliche Luftschichte, wie ein hier an einem Stativ befestigtes Thermometer anzeigt, dauernd von ihnen erwärmt wird zu einer annähernd constanten Temperatur von 36—38° C., also der Normaltemperatur der Abdominalhöhle des Thieres.

Es war die Absicht, oberhalb und im ganzen Umfange der geöffneten Bauchhöhle, also überall da, wo atmosphärische Luft mit den Eingeweiden und den Wandungen der Bauchhöhle in Berührung tritt, eine absolut constante Temperatur — 37,5°, gleich der Eigentemperatur der Theile, zu schaffen. Indessen war dies mit diesen zugleich complicirten und doch so elementaren Einrichtungen nur annähernd möglich, um so mehr als die Versuche angestellt werden mussten unter Verhältnissen, bei welchen störende Umstände nicht zu vermeiden waren: so zeigte das oberhalb des Abdomen placirte Thermometer trotz ungestörter Zufuhr der Wärme häufig vorübergehende Schwankungen gelegentlich von 5 Grad (bis auf 32 Grad) welche bewirkt wurden durch das schnelle Vorbeipassiren einer Person, durch das Oeffnen eines Fensters, einer Thüre, durch das Fließenlassen einer benachbarten Wasserleitung.

Durchschnittlich aber ist es gelungen, eine Temperatur von $36\text{--}38^{\circ}\text{C}$. in der Luft oberhalb des Abdomen zu erhalten.

Acht volle Stunde behielt das Thier die normale Temperatur, d. h. zwischen $39\text{--}37,5^{\circ}$. Wenn auch die Temperatur um $1,5^{\circ}$ gesunken ist, so kommt das von der bewegungslosen Lage, von der nicht stattgefundenen Nahrungsaufnahme etc. etc. Die peristaltischen Bewegungen blieben normal bis zuletzt, desgleichen alle Functionen des Peritonäums.

Dafs nur die Temperatur Erniedrigung und nicht die Qualität der Luft hier wirksam war, erkennt man aus den folgenden Experimenten.

- a. „Einem Kaninchen wurden 20 Ccmtr. destillirtes auf 35° erwärmtes Wasser in das Abdomen injicirt. Am nächsten Tage wurde das Thier bei vollkommenen Wohlbefinden getödtet. Die Peritonealhöhle war leer, keine weitere Veränderung sichtbar.“
- b. Derselbe Versuch mit 1% Kochsalzlösung; am nächsten Tage derselbe Erfolg, alles reforbirt, keine Veränderung.“
- c. Derselbe Versuch mit frisch gelassenem menschlichen Urine; am nächsten Tage derselbe Befund.“
- d. Derselbe Versuch mit künstlichem Serum; am nächsten Tage alles reforbirt, keine Veränderung im Abdomen.

Wegner, um zu beweisen, wie gefährlich für den Organismus eine faulige Zersetzung des Exsudates und wie grofs die Reforptionsfähigkeit des Peritonäums ist und wie selbst kleine Quantitäten gefährlich werden können, machte nun folgende Experimente:

- a. Einem Kaninchen von 1705 Gr. Körpergewicht wurden 200 Ccmtr. künstliches, erwärmtes Serum in die Peritonealhöhle injicirt. Es wird nach einer Stunde durch Verblutung aus der Carotis getödtet. In der

Bauchhöhle 66 Ccmtr. derselben Flüssigkeit resorbirt, sind also 136 Ccmtr., gleich 8% des gesammten Körpergewichtes.

- b. Einem Kaninchen heruntergekommen in Folge einer Eiterung, welche nach einer Exstirpation bulbi entstanden ist, von 1950 Gr. Körpergewicht, werden 250 Ccmtr. erwärmtes künstliches Serum in die Bauchhöhle gespritzt. Es wurde wieder nach einer Stunde durch Verblutung aus der Carotis getödtet; im Abdomen 165 Ccmtr. Serum, mithin resorbirt: 85 Ccmtr. gleich 4,3% des Körpergewichtes.“
- c. Einem Kaninchen von 1530 Gr. Körpergewicht werden 190 Ccmtr. erwärmtes künstliches Serum injicirt. Daselbe wird auf gleiche Weise nach einer Stunde getödtet. In der Peritonealhöhle sind noch 150 Ccmtr.; resorbirt also 60, gleich: 3,9% des Körpergewichtes.
- d. Einem Kaninchen von 1655 Gr. Gewicht werden 190 Ccmtr. künstlich erwärmtes Serum injicirt. Der Tod wird wieder nach einer Stunde durch Verbluten herbeigeführt; in der Peritonealhöhle 140 Ccmtr. Serum, also resorbirt: 50 Ccmtr. = 3,3% des Körpergewichtes.

Für die enorm schnelle Resorptionskraft des Peritonäums endlich zeigen die Experimente mit Medicamenten, wodurch man mit minimalen Gaben einen viel größeren Erfolg erzielen kann, als durch irgend eine andere Anwendungsart, nämlich durch den Mund, After oder subcutan.

Diese Schnelligkeit der Resorption kommt gleich der unmittelbaren Einspritzung in ein Blutgefäß.

Experiment: „Zwei gleich großen Kaninchen wird eine Spritze (von Pravaz) voll Chloralhydratlösung (50:100) eingespritzt; dem einen ins Unterhautzellgewebe, dem anderen ins Peritonäum; bei dem ersten tritt keine Wirk-

ung ein, bei dem zweiten, welches schon nach 4 Minuten schläfrig wird und bald umfällt, tritt schon nach 7 Minuten vollständige Hypnose ein.

Ganz daselbe kann man beobachten bei anderen löslichen Giften, z. B. Cyankalium, dessen tödliche Einwirkung vom Abdomen aus eine fast unmittelbare ist.

„Einem grossen kräftigen Kaninchen werden 50 Ccmtr einer stark concentrirten Kochsalzlösung injicirt. Tod nach 10 Minuten unter Krämpfen. In der Peritonealhöhle etwa noch 30 Ccmtr. einer mässigen salzig schmeckenden, eiweishaltigen Flüssigkeit; an der Serosa keine Hydrämie.

Wegner aber fand, dass sich Fäulniss fähige Flüssigkeiten, die zuvor mit der atmosphärischen Luft in Berührung gewesen sind oder mit atmosphärischer Luft im Peritonäum injicirt werden, sehr leicht zersetzen.

„Einem Kaninchen werden 50 Ccmtr. Serum mit einer gewissen Quantität Luft zugleich in die Bauchhöhle injicirt. Tod nach 20 Stunden. Unmittelbar nach dem Tode untersucht, finden sich etwa 20 Ccmtr. einer trüben, grauen, absolut geruchlosen Flüssigkeit in der Bauchhöhle. Dieselbe enthält, wie die mikroskopische Untersuchung zeigt, in ungeheurer Menge Kugelbakterien, grösstentheils in einzelnen Elementen, vielfach in Doppelgliedern bis zu Ketten von 6—8 Gliedern. An der ganzen Serosa des Darmes eine frisch punktirte Hydrämie. Die Lymphgefässe des Zwerchfelles sind angefüllt mit denselben Organismen; das Blut sowohl an peripherischen Theilen als auch besonders im rechten Ventrikel, vollkommen überladen mit denselben Organismen, die in einzelnen Präparaten oft an Zahl die rothen Blutkörperchen übertreffen.

Einem grossen Kaninchen werden 50 Ccmtr. frisch bereitetes Muskelfus mit 50 Ccmtr. Luft injicirt. Tod nach 19 Stunden. In cavo peritonei (unmittelbar nach dem Tode) untersucht, 30 Ccmtr. einer trüben, gelblich weislichen vollkommen geruchlosen Flüssigkeit. Die Serosa des Darmes,

namentlich des Dickdarmes, ebenso wie das parietale Blatt hyprämisch, auf ersterer zahlreiche punktförmige Ecchymosen. Herdweise auf denselben ein fetziger gelblicher Beleg. Die Nieren sehr blutreich, auf der Oberfläche viele feine Hämorrhagien leichte Schwellung der Milz, namentlich im Becken-Durchmesser. Im ganzen Darm dünnflüssiger Inhalt (intra vitam Diarrhoe). Die Flüssigkeit enthält neben wenig rothen Blutkörperchen und farblosen Rundzellen, eine ungeheure Anzahl niedriger Organismen zumeist von runder Gestalt, zum Theil ganz kurze Stäbchen darstellend, vielfach zweigliedrige, fesselartig geformte Gebilde, daneben auch mehrgliedrige Ketten. Dieselben finden sich als ganze Rasen auf der Fläche der Serosa, besonders auf der abdominalen Fläche des Zwerchfelles.

In dem Centrum teudineum sind Lymphgefäße und zum Theil die Saftkanäle damit angefüllt.

Im Herzblute ebenso wie in den peripheren Gefäßen überall zahlreiche Micrococci und Bakterien. Auch in dem ganz frischen Urin der Harnblase finden sich massenhaft dieselben Elemente.

„Einem Hunde werden 500 Ccmtr. künstliches Serum und eine erhebliche Menge Luft ins Peritonäum injicirt. Am nächsten Tage 41° C. Temperatur; Appetitlosigkeit, Erbrechen, Diarrhoe; am 2. Tage 40,1° C. Temperatur, übrigens dieselben Erscheinungen wie am vorigen Tage, das Thier offenbar sehr schwach und leidend. Ein Tropfen aus einem Ohrgefäße entnommenen Blutes zeigt, wie am vorhergehenden Tage, unter dem Mikroskope massenhafte Micrococci, kleinste Stäbchen Bakterien und semmelförmige zweigliedrige Organismen in lebhaftester Bewegung.

Dieselben finden sich ebenfalls in dem frischen, vermittels des Catheters der Blase entnommenen Urin. Am dritten Tage ist der Allgemeinzustand des Thieres etwas besser, 39,5° C. Temperatur, im Blute vereinzelt Organismen. In den nächsten Tagen kehrt das Thier allmählig zum völligen Wohlbefinden wieder zurück.

Aus dem Obigen geht nun wohl deutlich hervor, wie rasch und wie gefährlich die Zersetzung des Exsudates für den Organismus wirkt.

Jetzt aber ist eine Methode gefunden, die eben angeführten Schädlichkeiten zu verhüten. Um die Leibeshöhle ungefährlich eröffnen zu können, müssen wir folgendes beobachten: Das Operationszimmer muss ein infectionsfreies auf 22—25° C. erwärmtes sein.

Sämtliche Instrumente müssen sehr rein und stundenlang in eine 5 % auf 40° C. erwärmte Carbollösung gelegt sein, ebenso die Schwämme. Die Eröffnung des Unterleibes darf nur von sehr reinen, mit Carbolsäure wohl desinficirten Händen und nur unter dem Nebel von Carbol- oder Salicyl-Spray gemacht werden.

Die zu zerstäubende Flüssigkeit muss zuvor auf eine relativ hohe Temperatur gebracht werden. Der Strahl der Zerstäubungsapparate muss von 2 verschiedenen Seiten kommen, damit die offene Bauchwunde nie dieses schützenden Nebels entbehrt, wenn auch die Hand des Operateurs hie und da gezwungen ist, zwischen Zerstäubungsapparat und Wunde durchzulangen.

Nach vollendeter Operation muss das Peritonäum, sowohl dessen parietales, wie dessen viscerales Blatt, sorgfältig mit neuen wohl entfandeten und desinficirten Schwämmen gereinigt, jede Blutung durch Unterbindung der blutenden Gefäße mit Catgut sorgfältig gestillt und die Bauchhöhle mit Doppelnähten (Entspannungsnähte und einfache Nähte) gut geschlossen und der Leib mit einem antiseptischen Verbands umhüllt werden.

Viele unter solchen Vorichtsmassregeln ausgeführte Operationen beweisen, dass man thatsächlich das Peritonäum ohne Gefahr für das Leben verletzen kann.

Nun aber kommt die zweite Frage.

Kann man auch den Magen gefahrlos verletzen, und

Theile desfelben herausfchneiden ohne groſſe Lebensgefahr?

Auch dieſe Fragen können bei dem gegenwärtigen Stande der Chirurgie in günſtiger Weiſe beantwortet werden.

Vorerſt wollen wir eine Reihe von Eingriffen überhaupt zuſammenſtellen, welche am Magen mit glücklichem Reſultate ausgeführt wurden: Gaſtratomien zur Entfernung fremder Körper; ferner Gaſtratomien zur Bewerktiſtlegung künstlicher Ernährung und dann wollen wir einige gelungene Thierexperimente aufzählen, wobei mehr oder weniger groſſe Stücke aus dem Magen ausgeſchnitten worden waren und das Leben und die Ernährung nicht gefährdet wurden und ſchlüſſlich werden wir analoge Eingriffe am Menſchen aufzählen und die Summe der Thatſachen wird unfere Hoffnung, daſs in Bälde Magenkrebs durch Operationen glücklich entfernt werden dürften, nicht mehr als ſinnreichen Traum erſcheinen laſſen, wie Dieffenbach noch des geiſtreichen Merrens Ausſpruch nannte, ſondern als eine berechtigte Erwartung.

1) Zur Entfernung fremder Körper wurden viele Gaſtratomien mit Glück ausgeführt:

Florian Mathis aus Brandenburg ſchnitt einem 36jährigen böhmifchen Bauern ein $9\frac{3}{4}$ Zoll langes Meſſer mit Glück aus dem Magen heraus, nachdem deſſen Spitze in der 7. Woche nach dem Verſchlucken durchzuſpieſſen drohte.

Daniel Schwabe hat am 25. Juni 1830 dem 22jährigen Bauern Grunheide ebenfalls ein Meſſer glücklich aus dem Magen herausgeſchnitten, welches 4 Wochen vorher, als ſich Grunheide mit dem Meſſerſtiel im Schlunde kitzelte und Erbrechen erzeugen wollte, ausgeglitten und in den Magen gekommen war.

Dr. Wiſener, der kurheſſiſche Phyſikus nahm am

II. August 1691 dem 16jährigen Bauernknaben Rudluff mit bestem Erfolge ein Messer aus dem Magen, welches der Knabe am 3. Januar mit den Zähnen aus einer Bank herausziehen wollte, in den Rachen brachte, nicht mehr herausbefördern konnte, sondern mit Bier und Oel in den Magen hinunterschwemmte.

Dr. Hübner entfernte 1720 ebenfalls bei einer Frau, welche sich mit einem 7 Zoll langen Messer Erbrechen erregen wollte, und dasselbe in den Magen gebracht hatte, das lange und starke Messer 11 Tage nach dem Verschlucken glücklich durch Gastrotomie, indem er an jener Stelle, wo die Messerspitze nach Aufsen durchzubohren drohte, einschchnitt und das Messer mit einem kleinen Zuge herausbeförderte.

Fritzack ein geschickter Wundarzt zu Toulouse nahm einem Packträger durch Gastrotomie, der Linea alba parallel, eine verschluckte Messer-Klinge heraus. Der Schnitt war anfangs sehr klein. Doch erlaubte derselbe die Messerspitze mit einer Pinzette zu fassen. Fritzack erweiterte dann diese Wunde mit gekrümmten Bistourie und zog die Klinge aus.

Dr. Cayrode entfernte am 19. Mai 1819 eine 7 Zoll lange Gabel durch Schnitt aus dem Magen einer 24jährigen Frau, welche 6 Monate früher, als sie sich mit dem Gabelstiele im Schlunde zum Erbrechen reizen wollte, selbe verschluckt hatte. Jeder Zinken der Gabel mußte mit einem eigenen Schnitte befreit werden. Auch dieser Fall verlief glücklich.

Dr. Reynaud zu Romans nahm auch eine Gabel durch Gastrotomie mit glücklichem Erfolge heraus. Ein Taschenspieler hatte selbe vor 31 Tagen verschluckt.

Dr. Bell zu Walpello nahm am 3. Jänner 1855 mit Glück die Gastrotomie an einem Manne vor, welcher am 1. Jänner ein großes Bleistück verschluckt hatte. Das entfernte Blei war $10\frac{1}{2}$ Zoll lang und $9\frac{1}{2}$ Unzen schwer.

Dr. Leon Labbé macht im April 1876 die Gastrotomie zu Paris mit glücklichem Erfolge, indem er eine 2 Jahre früher verschluckte Gabel, welche aber trotz ihres langen Verweilens zwischen Magen und Bauchwand keine Adhaesion erzeugt hatte, mit der Polypenzange vorsichtig herauszog, nachdem er den Magen vor seiner Eröffnung mit 8 Nähten an die Bauchwunde angenäht hatte.

2. Gastrotomien wurden bereits auch sehr oft versucht, um bei unheilbaren Oerophagus-Stricturen eine künstliche Ernährung zu ermöglichen.

Allein 26 von Dr. Kaifer in Heidelberg gesammelte Fälle verliefen tödtlich, bis endlich im Jahre 1876 Verneuil seine weltberühmte Operation veröffentlichte. Ein 17jähriger Mann hatte Aetzkali-Lauge verschluckt und eine unheilbare Oerophagusstrictur bekommen. Trotz der besten Klystiere schien Patient an Schwäche zu sterben, weshalb Verneuil am 26. Juli 1876 unter Lister'schem Verfahren die Gastrotomie ausführte und den Kranken rettete. Die Ernährung durch die künstliche Magenfistel war so genügend, daß Patient schon im August das Bett verlassen konnte und an Körpergewicht bedeutend zunahm.

Unser hochgeehrter Prof. Trendelenburg lieferte im März 1877 aber schon einen zweiten noch glücklicheren Fall. Ein 8jähriger Knabe hatte sich den Schlund mit Schwefelsäure verbrannt. Die entstandene Stricture trotzte jedem Verfahren. Professor Trendelenburg öffnete die Bauchhöhle, zog den Magen an die Wunde vor, nähte ihn mit 15 Seidennähten an, eröffnete ihn und legte ein Cautschoukrohr ein. Der Knabe nährt sich prächtig. Er kaut die Speisen im Munde und spuckt den eingespeichelten Brei durch das Cautschoukrohr in den Magen. Der Knabe soll noch jetzt leben und gedeihen.

Prof. Schönborn machte fast zur gleichen Zeit die gleiche Operation und auch mit glücklichem Erfolge wegen

krebfiger Strictur des Oesophagus. Der Patient kaute ebenfalls die Speifen und schüttete selbe dann in den Magen. Er lebte noch drei Monate.

3. Endlich wollen wir einige Thierexperimente aufzählen, wobei grössere oder kleinere Stücke des Magens resecirt wurden und der Erfolg ein glücklicher war.

Gufsenbauer und Winimarter haben 1876 Thierexperimente veröffentlicht, wobei ein Stück des Magens resecirt worden war. Von 8 Experimenten glückten zwei, so daß die Versuchsthierc längere Zeit lebten, obwohl der Sectionsbefund aller ein sehr ermunternder war.

Scriba und Kaifer machten nun 1876 nach obiger Publikation auf Veranlassung ihres Meisters H. Pf. Czerny in Heidelberg eben solche Experimente, aber mit noch viel glücklicherem Erfolge.

Am 31. März 1876 schnitten selbe unter Lifter'schen Cautelen einem großen Hühnerhunde ein ringförmiges Stück mit dem Pylorus, von $3\frac{1}{2}$ Centm. Länge aus dem Magen aus. Duodenum und Magen wurden mit 17 Seidennähten vereinigt, nachdem aus dem zu weiten Magen ein Zwickel ausgeschnitten worden war.

Die Operation hatte unter guter Narcofe 2 Stunden gedauert. Ein Lifter'scher Verband wurde angelegt und erst nach 20 Stunden etwas Milch als Nahrung gegeben. Am 3. Tage gab man schon Fleisch und Suppe. Am 5. Tage wurden die oberflächlich, am 8. Tage die tiefen Nähte herausgenommen. Der Hund genas sehr rasch und lebte gesund, wurde zu verschiedenen anderen Experimenten benützt und am 3. April 1877 durch Curare vergiftet. Der Sectionsbefund war äußerst ermunternd. Die Narbe war schön linear und die Magenschleimhaut sprang nur als ringförmige Wulst etwas hervor. Die Seidennähte waren meist deutlich zu erkennen, vielleicht von einem dünnen Endothelhäutchen überkleidet, andere eingekapselt.

Mehrere Versuche sind natürlich vom Tode gefolgt gewesen, theils erholten sich die Thiere von der Operation nicht mehr, theils kam tödtliche eitrige Peritonitis etc.

Am 27. April 1876 schnitten Scriba und Kaiser einem weissen, mittelgrossen Pudel einen $5\frac{1}{2}$ Ctm. langen Ring dicht hinter dem Pylorus aus dem Magen aus. Der Hund genas schnell und lebte monatelange gesund.

Am 25. September nahmen selbe einem schwarzen kräftigen Pinscher ein querelliptisches Stück aus der vorderen Magenwand heraus, welches 4 Ctm. Länge $2\frac{1}{2}$ Ctm. Breite hatte. Am 6. Oktober war der Hund vollkommen gesund zu nennen und lebte wie früher.

Am 16. Mai schnitten sie einem schwarzen, glatthaarigen Hunde den Magen, die Milz und einen Theil des Netzes aus; und am 27. Mai war das Thier bereits munter und gesund und nahm sogar an Gewicht zu. Doch am 6. Juni war er weniger munter und wurde Abend tod gefunden. Man fand bei der Section im Bauche Eiter.

Am 22. Dezember wurde einem kleinen glatthaarigen schwarzen Hunde nahezu der ganze Magen exstirpirt. Das herausgenommene Stück hatte an der grossen Curvatur 15 Ctm. Länge, an der kleinen 5 Ctm. Ende Januar konnte er gesund genannt werden und nahm sehr an Gewicht zu. Am 10. September 1877 wog er um 1200 Gramm mehr als zur Zeit der Operation.

Zu diesen glücklichen Experimenten der neuesten Zeit dürfen wir auch noch 2 Fälle älteren Datums zählen.

Merrem hatte einem Hunde den Pylorm exstirpirt. Der Hund genas vollkommen, wurde ihm aber am 27. Tage gestohlen.

Auch James Reoch brachte von seinen Versuchsthieren, denen er ein kleines Stück Magen exstirpirte, einen Hund glücklich durch, so dass derselbe monatelang lebte.

4. Schliesslich wollen wir noch einige glückliche Operationen am Menschen selbst notiren, welche mit einer Excision des Magenkrebses sehr viel Analogie zeigen.

Schon Dieffenbach soll mit Glück ein Stück krebfigen Darmes am Menschen ausge schnitten haben.

Raybord verlor 1844 seinen Patienten, welchem er ein carcinomatoefes Stück Darm weggeschnitten hatte, erst nach 6 Monaten an Krebsrecidive.

In der Jetztzeit gelang es H. Prof. von Dittel in Wien ein gangraenoefes Stück Darm mit Glück zu excidiren und die Wundränder zu vereinigen.

Bald darauf veröffentlichte Prof. Billroth einen ähnlichen Fall.

Wenn wir nun in diesen 4 Operationsreihen auch nur die glücklich verlaufenden Fälle angeführt haben und zugeben, daß die Zahl der unglücklich ausgegangenen gewiß eine 10fach gröfsere ist, so muß bei der Erfahrung, daß Magenkrebs oft und oft zur Todesurfache werden, doch die Hoffnung aufrecht erhalten werden, durch weitere Versuche die benannte Operation so zu vervollkommen, daß sie als lebensrettend gerechtfertigt erscheint.

Gerade für den Pylorus scheinen die Chancen günstig zu stehen und nach den von Gußenbauer und Winiwarter gemachten Forschungen ergab sich, daß bei 903 Fällen von Magencarcinom 542 Male der Pylorus erkrankt war. Deshalb möchten wir die vorstehende Indication nicht eine jugendliche Fantasie nennen lassen, sondern eine auf mühsam erworbene Thatfachen gebaute Hoffnung.
